

BOMBINA VARIEGATA EN PICARDIE

François SUEUR, Xavier COMMECY, Hugues DUPUICH & Laurent GAVORY

Groupe Environnement Protection et Ornithologie en Picardie,  
Musée de Picardie, Rue de la République, 80000 Amiens, France

ABSTRACT. - Two adults of *Bombina variegata* observed in the Aisne department (France) in 1983 are the only trace of the present occurrence in Picardy of this species, the old status of which is discussed.

*Bombina variegata* est assez peu observé dans l'ensemble de la France dans le cadre de l'enquête de répartition des Amphibiens. Deux hypothèses ont été avancées par BREUIL & PAILLETTE (1983) pour expliquer ce fait:

(1) les données anciennes présentaient une image exagérée de l'abondance réelle de *B. variegata* à l'époque, hypothèse pouvant être rejetée de manière certaine dans quelques régions;

(2) cette espèce serait en voie de régression en France; hypothèse en partie confirmée par les résultats de l'enquête en 1983 (BREUIL & PAILLETTE, 1984).

La présente note a pour but de présenter les statuts passé et actuel de *B. variegata* en Picardie.

MARCOTTE (1860) mentionne *B. variegata*, qu'il nomme d'ailleurs par erreur Sonneur à ventre de feu *B. bombina*, dans les étangs saumâtres de l'arrondissement d'Abbeville (Somme) situés dans la plaine maritime picarde. PARENT (1981), reprenant les données anciennes et récentes, indique la présence de *B. v. variegata* dans l'Aisne et l'est de la Somme mais ne donne aucune précision sur le statut de cette espèce dans l'Oise. En fait, aucune donnée moderne n'est connue de la Picardie (Anonyme, 1978); les lieux d'ob-

servations les plus proches sont situés dans les Ardennes (carte I.G.N. 1/50.000° de Vouziers), en Champagne (carte I.G.N. 1/50.000° de Reims) et en Ile-de-France (carte I.G.B. 1/50.000° de Meaux). Dans la vallée de la Somme où certains secteurs ont été très régulièrement prospectés, nous n'avons trouvé aucune trace de *B. variegata*. Ce n'est que le 3 juillet 1983, dans une ornière remplie d'eau de la forêt de Ris (Aisne, carte I.G.N. 1/50.000° de Château-Thierry) que nous avons rencontré cette espèce sous la forme de deux adultes avec peut-être également des têtards (SUEUR, 1984). Cette observation semble donc être la seule donnée étayée de l'époque moderne et montre bien la rareté de cette espèce dans la région picarde.

#### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ANONYME, 1978. - Atlas préliminaire des Reptiles et Amphibiens de France. Montpellier, Société Herpétologique de France: i + 1-137.
- EREUIL, M. & PAILLETTE, M., 1983. - Bilan de l'enquête de répartition des Amphibiens en France pour l'année 1982. *Alytes*, 2: 2-8.
- 1984. - Bilan de l'enquête de répartition des Amphibiens en France pour l'année 1983 et orientations proposées pour 1984. *Alytes*, 3: 1-10.
- MARCOTTE, F., 1860. - Les animaux vertébrés de l'arrondissement d'Abbeville. *Mém. Soc. Emul. Abbeville*, 9: 217-470.
- PARENT, G. H., 1981. - Matériaux pour une herpétofaune de l'Europe occidentale. Contribution à la révision chorologique de l'herpétofaune de la France et du Benelux. *Bull. Soc. Linn. Lyon*, 50: 86-111.
- SUEUR, F., 1984. - Poissons, Amphibiens, Reptiles et Mammifères de la baie de Somme et de la plaine maritime picarde. Rue, Sueur: i-iv + 1-59.